

NOTA

PRIMERA CITA DEL BURLISTO CHICO (*CONTOPUS CINEREUS CINEREUS* SPIX) PARA LAS PROVINCIAS DE LA PAMPA Y BUENOS AIRES, ARGENTINA (AVES, TYRANNIDAE)

Juan J. MACEDA¹, Pablo TEJERINA¹, Aníbal R.
CAMPERI² & Carlos A. DARRIEU²

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, Uruguay 151, 6300 Santa Rosa, La Pampa, Argentina. E-mail: jmaceda@exactas.unlpam.edu.ar y ptejerina@latinmail.com ² División Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Buenos Aires, Argentina. E-mail: acamperi@museo.fcnym.unlp.edu.ar y cdarrieu@museo.fcnym.unlp.edu.ar

SUMMARY: First record of Tropical Pewee (*Contopus cinereus cinereus* Spix) from La Pampa and Buenos Aires provinces, Argentina (Aves, Tyrannidae).

Contopus c. cinereus is recorded for the first time from La Pampa and Buenos Aires provinces. The specimens were collected in puesto "Los Toldos", 10 km south of La Humada (La Pampa) and Zelaya (Buenos Aires). The meristic data of specimen from La Pampa is provided.

Key words: Tropical Pewee, *Contopus cinereus cinereus*, distribution, La Pampa, Buenos Aires.

RESUMEN: Primera cita del Burlisto Chico (*Contopus cinereus cinereus* Spix) para las provincias de La Pampa y Buenos Aires, Argentina (Aves, Tyrannidae).

Contopus c. cinereus Spix se cita por primera vez para las provincias de La Pampa y Buenos Aires. El ejemplar de La Pampa se coleccionó en el puesto "Los Toldos", 10 km al sur de La Humada, y el espécimen de Buenos Aires procede de Zelaya. Se presentan datos merísticos del ejemplar capturado en La Pampa.

Palabras clave: Burlisto Chico, *Contopus cinereus cinereus*, distribución, La Pampa, Buenos Aires.

El género *Contopus* Cabanis está representado en la Argentina por tres especies: *C. fumigatus* d'Orbigny y Lafresnaye que habita en el noroeste argentino (Jujuy, Salta y Tucumán) (Canevari *et al.*, 1991) y que fue citada también para Córdoba (Cobos *et al.*, 1999), *C. cinereus* (Spix) con las subespecies *C. c. pallescens* (Hellmayr) para Jujuy, Salta y Tucumán y *C. c. cinereus* para Misiones (Short, 1975), y *C. virens* (Linnaeus) cuya presencia en la Argentina requiere confirmación (Narosky & Yzurieta, 2003) y de la que existe un único registro correspondiente a Orán, Salta (Höy, 1981).

Durante un relevamiento de la fauna de las áreas protegidas de La Pampa, el 28 de septiembre de 2002 se coleccionó un ejemplar macho de *C. cinereus* en el puesto "Los Toldos" (36° 24' S,

68° 04' O), ubicado 10 km al sur de la localidad de La Humada, en el extremo noroeste de la provincia. De dicho espécimen se obtuvieron medidas morfométricas de acuerdo con las indicaciones de Baldwin *et al.* (1931): longitud total 137,4 mm; culmen 6,5 mm; ala 73 mm; cola 60 mm y tarso 15 mm; peso corporal: 10 gramos.

La vegetación del área corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte (Cabrera & Willink, 1973; Cabrera, 1976; Cano *et al.*, 1980), caracterizada por un clima seco y fresco, con 80 a 200 mm de precipitación anual y cuya comunidad climática es el "jarillal" (asociación de especies del género *Larrea*). Cabe aclarar que el ejemplar procede de un ambiente antrópico, ya que fue capturado mientras se desplazaba por las ramas de un olmo (*Ulmus pumilla*) próximo a una vivienda.

Para su asignación subespecífica se revisaron ejemplares de las colecciones ornitológicas del Museo de La Plata y del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", Buenos Aires, y se pudo comprobar que existe una piel de *C. cinereus cinereus*, obtenida en mayo de 1936 en la localidad de Zelaya (34° 21' S, 58° 52' O), provincia de Buenos Aires (ejemplar N° 35143 MACN), erróneamente asignada a *Empidonax euleri* por Pereyra (1938).

Cabe mencionar que esta especie no fue citada para Buenos Aires por Narosky & Di Giacomio (1993) ni para La Pampa por Aravena (1969), por lo tanto estos nuevos registros amplían considerablemente su área de distribución.

Los ejemplares fueron capturados en las provincias mencionadas, fuera de la época reproductiva, y representarían individuos aislados de poblaciones migradoras del extremo nordeste de nuestro país, aunque tal aseveración requeriría confirmación ya que ningún autor, hasta el momento, ha aportado algún dato al respecto. La escasez de relevamientos adecuados y la dificultad para identificar la especie a campo permiten suponer que la misma podría estar presente durante la estación reproductiva no sólo en La Pampa y Buenos Aires, sino también en otras provincias del centro de la Argentina.

BIBLIOGRAFÍA

- ARAVENA, R. O., 1969. Vertebrados de La Pampa. *Biblioteca Pampeana, Serie Folletos*, 13, 31 pp.
- BALDWIN, S. C. OVERHOLSER & G. WORLEY, 1931. Measurements of birds. *Sci. Publ. Cleveland, Mus. Nat. Hist.*, 2: 1-165.
- CABRERA, A. L., 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. *Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería*, 2 (1): 1-85.
- CABRERA, A. L. & A. WILLINK, 1973. *Biogeografía de América Latina*. Washington D. C., 120 pp.

- CANEVARI, M. P., G. R. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRÍGUEZ MATA & R. J. STRANECK, 1991. *Nueva guía de las aves argentinas. Tomo 2.* Fundación Acindar, 497 pp.
- CANO, E., B. FERNÁNDEZ & M. MONTES, 1980. Vegetación. *En: INTA, Prov. La Pampa, Fac. de Agronomía (eds.) Inventario Integrado de los Recursos Naturales de la Prov. de La Pampa*, 893 pp.
- COBOS, V., R. MIATELLO & J. BALDO, 1999. Algunas especies de aves nuevas y otras con pocos registros para la provincia de Córdoba, Argentina, II. *Nuestras Aves*, 39: 7-11.
- HÖY, G., 1981. Un ave nueva para la Argentina, *Contopus virens* Linne (Aves, Tyrannidae). *Historia Natural*, 2 (5): 43-44.
- NAROSKY, T. & A. G. DI GIACOMO, 1993. *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus.* Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. L.O.L.A. (Literature of Latin America), 127 pp.
- NAROSKY, T. & D. YZURIETA, 2003. *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de oro.* Vázquez Mazzini Ed., 353 pp.
- PEREYRA, J. A., 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. *Mem. Jard. Zool.*, 9 (Parte 2da.): 1-304.
- SHORT, L. L., 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 154: 165-352.

Recibido: 09/10/03

Aceptado: 15/04/04

Fecha de distribución: 15/12/04